



Splošno

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes bo razmeroma sončno. V vzhodni Sloveniji bo možna le kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 °C. Ponoči bo sprva pretežno jasno, proti jutru pa se bo oblačnost od zahoda povečala.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine se bodo v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko pojavljale že dopoldne, drugod pa predvsem sredi dneva in popoldne. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 18 do 24 °C.

Obeti V sredo in četrtek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem plohami in nevihtami. Več jih bo v četrtek.

Vremenska slika Ciklonsko območje nad vzhodno Evropo se počasi polni, nad zahodnim Sredozemljem pa že nastaja nov ciklon. V višinah priteka k nam nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak.

*Vir: ARSO, ponedeljek, 19. maj 2025 ob 11:00

SVETOVANJE

Osrednjeslovenska, notranjska, gorenjska in primorska regija

Primož Štepic, dipl. ing. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

JV, posavska, zasavska, savinjska in koroška regija

Marjan Kragl, univ. dipl. ing. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Podravska in pomurska regija

Drago Majcen, univ. dipl. ing. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl.inž.agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Marketing in razvoj

Andrej Kos, univ. dipl. ing. agr.
041 689 120, andrej.kos@karsia.si

Ukrepi po toči

Pred dnevi je nekatere predele Slovenije prizadelo neurje s **točo**. Priporočamo, da poškodovane rastline v najkrajšem možnem času poskropite s pripravki na osnovi aminokislin ali morskih alg. Uporabimo jih v kombinaciji z dovoljenimi fungicidi v posamezni kulturi, ki imajo funkcijo zaščite in celjenja ran. **Priporočila:**

Pečkarji

- **Merpan 80 WDG** v odmerku **1,88 kg/ha** (188 g/hL) ali
- **Amylo-X**  v odmerku **1,5-2,5 kg/ha** (150-250 g/hL) v kombinaciji z aminokislinami:
- **Protifert LMW**  v odmerku **3,5 L/ha** (350 mL/hL) ali
- **Drin** v odmerku **1,5 L/ha** (150 mL/hL) ali morskimi algami:
- **ExelGrow**  v odmerku **1,0 L/ha** (100 mL/hL)

Koščičarji in jagodičevje

- **Karbicare**   v odmerku **5,0 kg/ha** (500 g/hL); priporoča se samostojna uporaba.
- **Amylo-X**  v odmerku **1,5-2,5 kg/ha** (150-250 g/hL) v kombinaciji z aminokislinami:
- **Protifert LMW**  v odmerku **3,5 L/ha** (350 mL/hL) ali
- **Drin** v odmerku **1,5 L/ha** (150 mL/hL) ali morskimi algami:
- **ExelGrow**  v odmerku **1,0 L/ha** (100 mL/hL)

Vinska trta

- **Folpan 80 WDG** v odmerku **1,25 kg/ha** (125 g/hL) ali
- **Folpan Gold** v odmerku **2,0 kg/ha** (200 g/hL) ali
- **Momentum Trio** v odmerku **3,0 kg/ha** (300 g/hL) ali
- **Amylo-X**  v odmerku **1,5-2,5 kg/ha** (150-250 g/hL), ki jih uporabimo v kombinaciji z aminokislinami:
- **Protifert LMW**  v odmerku **3,5 L/ha** (350 mL/hL) ali
- **Drin** v odmerku **1,5 L/ha** (150 mL/hL) ali morskimi algami:
- **ExelGrow**  v odmerku **1,0 L/ha** (100 mL/hL)

Poljščine in vrtnine

- **Banjo** v odmerku **0,4 L/ha** (40 mL/hL) za krompir, **0,5 L/ha** (50 mL/hL) za čebulo in šalotko ter **0,2 L/ha** (20 mL/hL) za korenovke.
- **Amylo-X**  v odmerku **1,5-2,5 kg/ha** (150-250 g/hL) za solate in plodovke v kombinaciji z aminokislinami:
- **Protifert LMW**  v odmerku **3,5 L/ha** (350 mL/hL) ali
- **Drin** v odmerku **1,5 L/ha** (150 mL/hL) ali morskimi algami:
- **ExelGrow**  v odmerku **1,0 L/ha** (100 mL/hL)



Odlomljene mladice



Poškodovani plodiči



Protifert LMW, Drin in ExelGrow



Amylo-X in Karbicare

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen poprh in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin. **Priporočilo:**

- **Nu-Film-Premium**  v odmerku **30 mL/hL**. Sredstvo se ne peni, preden ga vlijemo v rezervoar pa ga je potrebno raztopiti v manjši količini vode.



Nu-Film-Premium

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom ali pufrom, ki vodo za škropljenje zakisa. **Priporočilo:**

- **pH minus** v odmerku **44-104 mL/hL vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno



pH minus

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**. V takem primeru se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres. **Priporočilo:**

Sredstva na osnovi aminokislin:

- **Protifert LMW**  v odmerku **3,5 L/ha** (350 mL/hL)
- **Drin** v odmerku **0,4-1,7 L/ha** (40-170 mL/hL)

Sredstva na osnovi morskih alg:

- **Goëmar BM 86**  v odmerku **3,0 L/ha** (300 mL/hL)
- **ExelGrow**  v odmerku **1,0 L/ha** (100 mL/hL)



Protifert LMW in Drin



ExelGrow in Goëmar BM 86

Splošna priporočila

OPOMBA: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha. Porabo vode je potrebno prilagoditi posamezni kulturi, njeni vzgojni obliki in razvojni fazi ter zahtevam naprave za nanašanje.

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.