



Splošno

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes popoldne bo jasno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo šibka burja prehodno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Goriškem do 32 °C.

Jutri bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo zjutraj nekaj več oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 18 °C, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 33 °C.

Obeti V soboto in nedeljo bo pretežno jasno z dnevnimi temperaturami okoli 30 °C, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja.

Vremenska slika Nad večino Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ciklon s fronto je ob britanskem otočju. K nam v višinah s severozahodnim vetrom doteka suh in topel zrak.

*Vir: ARSO, ponedeljek, 12. junij 2025 ob 13:00

SVETOVANJE

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, go-renjska, osrednjeslovenska, zasavska in Bela krajina
Primož Štepic, dipl. ing. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška,
Matej Ščuka, mag. ing. agr.
031 316 296, matej.scuka@karsia.si

Posavska, asavska, savinjska in koroška regija
Marjan Kragl, univ. dipl. ing. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Podravska in pomurska regija
Drago Majcen, univ. dipl. ing. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl.inž.agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Marketing in razvoj
Andrej Kos, univ. dipl. ing. agr.
041 689 120, andrej.kos@karsia.si

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si



Ukrepi za omilitev suše

Letošnji maj, je v svetovnem pogledu, bil eden izmed najtoplejših od kar se opravljajo meritve. V določenih predelih Slovenije, predvsem na SV, v letošnjem letu ni padlo niti 200 L dežja/m², zato se suša na nenamakanih poljščinah že močno pozna. Ob nadaljevanju takšnih pogojev, pa se bo pričela kazati tudi v trajnih nasadih. Po dolgoročnih napovedih, naj bi pred nami bilo zelo vroče in suho poletje, kar pomeni še večji stres za naše rastline. Pomanjkanje talne vlage in visoke temperature povzročijo negativne fiziološke spremembe, kot je izsuševanje rastlin, prenehanju oskrbe s hranili iz tal, prekomerni transpiraciji in prenehanja fotosinteze. Vse to vodi rastline k reakciji za preživetje, kar opazimo kot ustavitev vegetativne rasti in generativne rasti (odvržejo plodove, kot npr. lani v primeru jablan, ko je prišlo do množičnega odpadaja plodov).

Poleg namakanja imamo možnost omilitvenih ukrepov z dodajanjem foliarnih mineralnih hranil kot sta **kalij** in **mangan** ter sredstev na osnovi **aminokislin** in **morskih alg**. **Kalij** kot hranilo regulira odpiranje listnih rež in pospešuje sprejem vode iz tal, **mangan** pa je energija za fotosintezo pri visokih temperaturah. **Priporočila:**

Sredstva na osnovi aminokislin

- **Protifert LMW**  v odmerku **3,5 L/ha** (350 mL/hL) ali
- **Drin** v odmerku **1,5 L/ha** (150 mL/hL). Obe sredstvi lahko kombiniramo s foliarnimi gnojili kot sta **Proteoleaf** ali **Karsia Mangan**.

Sredstva na osnovi morskih alg

- **ExelGrow**  v odmerku **1,0 L/ha** (100 mL/hL). Sredstvo lahko kombiniramo s foliarnimi gnojili kot sta **Proteoleaf** ali **Karsia Mangan**.

Sredstva na osnovi mineralnih hranil

- **Protifert kalij** v odmerku **3,5 L/ha** (350 mL/hL)
- **Proteoleaf** v odmerku **3,5 kg/ha** (350 g/hL)
- **Karsia Mangan** v odmerku **2,0 L/ha** (200 mL/hL)

Opozorilo: škropljenja opravimo v zgodnjih jutranjih ali večernih urah, ko temperatura ni višja od 25 °C.



Suša v koruzi



Suša v oljnih bučah



Protifert LMW, Drin in ExelGrow



Protifert kalij, Proteoleaf, Karsia Mangan

Splošna priporočila

OPOMBA: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha. Porabo vode je potrebno prilagoditi posamezni kulturi, njeni vzgojni obliki in razvojni fazi ter zahtevam naprave za nanašanje.

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.