



Sadjarstvo - lupinarji

Vremenska napoved za Slovenijo *

Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zvečer se bo od severozahoda jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 °C.

Jutri bo zjutraj bo delno jasno, več zmerne oblačnosti bo lahko na severovzhodu. Ponekod po kotlinah bo kratkotrajna megla. Čez dan bo delno jasno s kopasto oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 28 °C.

Obeti V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bodo na Primorskem možne krajevne padavine. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe in nevihte možne tudi drugod. V ponedeljek kaže na sončno vreme, verjetnost za plohe je majhna.

Vremenska slika Nad državami ob Baltiku se nahaja ciklon z vremensko fronto. V pasu od zahodne, deloma srednje Evrope, prek Velike Britanije do Norveške se nahaja območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka bolj vlažen in še vedno hladen zrak.

*Vir: ARSO, petek, 11. julija 2025 ob 09:00

SVETOVANJE

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska
Primož Štepic, dipl. ing. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška
Matej Ščuka, mag. ing. agr.
031 316 296, matej.scuka@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija
Marjan Kragl, univ. dipl. ing. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Podravska in pomurska regija
Drago Majcen, univ. dipl. ing. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl.inž.agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Marketing in razvoj
Andrej Kos, univ. dipl. ing. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin


www.karsia.si

Varstvo in prehrana lupinarjev

Orehova muha

V lanskem letu ni bilo večjih težav z orehovo muho, ki se je zelo redko pojavljala. Letos so bili zaradi dolgotrajnega sušnega vremena pogoji za njen pojav dokaj neugodni, po tem obilnem deževju pa se je pričela pojavljati. Pridelovalcem priporočamo, da v nasade izobesijo rumene lepljive plošče (RLP) in to najmanj dve na hektar. Eno obesimo na višino 2 m krošnje, drugo pa čim višje v krošjo. Oddaljenost med drevesi z vabami naj bo vsaj 20-30 m. S škropljenjem pričnemo 4-6 dni po pričetku leta muhe, oziroma ulova na RLP. **Priporočilo:**

- **Laser Plus v odmerku 75 mL/ha** (7,5 mL/hL). Poškropimo samo eno tretjino spodnjega dela krošnje na vzhodni ali severni strani. V primeru močnega izpiranja (ploha z več kot 10 mm dežja) je potrebno škropljenje ponoviti. Sredstvo obvezno uporabljamo v kombinaciji z beljakovinsko vabo **Nutrel v konc. 1,5 %** (1,5 L/hL), ker sicer ne bo želenega učinka na muho. **Laser Plus** lahko v eni rastni dobi uporabimo 3-krat.
- **Mospilan 20 SG v odmerku 375 g/ha** (37,5 g/hL) ima v letošnjem letu dovoljenje za nujne primere in ga lahko uporabimo 1-krat v rastni dobi. S sredstvom tretiramo celo krošnjo drevesa, v primeru lanskega močnejšega napada pa se ga priporoča za prvo tretiranje. Uporaba je dovoljena do 1.10.25.



Orehova muha



Laser Plus, Nutrel in Mospilan 20 SG

Foliarna prehrana

V zadnjih letih je bilo zaradi **suše** prizadetih veliko dreves. Zato je nasade ali posamezna drevesa smotrno sproti tretirati s pripravki na osnovi **aminokislin** in dvigovati odpornost z dodajanjem **bakrovih** gnojil. Prav tako je pomembno tudi dodajanje **žvepla**, ki poveča vsebnosti maščob in pripomore k izrazitejšemu okusu. **Priporočilo:**

Stres/suša


- **Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha** (do 350 mL/hL)
Drin v odmerku do 1,5 L/ha (do 150 mL/hL).

Dvig odpornosti

- **Karsia Baker v odmerku do 3,0 L/ha** (300 mL/hL).
Uporabljamo ga izmenično, s pripravki na osnovi aminokislin.

Prehrana z žveplom

- **Karsia Žveplo v odmerku do 3,0 L/ha** (300 mL/hL).
Uporabljamo ga izmenično, s pripravki na osnovi aminokislin.



Zdravi plodovi



Karsia Baker in Karsia Žveplo

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin.

V ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/100 L**. Sredstvo je dovoljeno tudi v ekološki pridelavi.



Nu-Film-Premium

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- **pH minus v odmerku 44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno



pH minus

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**. V takem primeru se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres.

Sredstva na osnovi aminokislin:

- **Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha** (350 mL/hL)
- **Drin** v odmerku **0,4-1,7 L/ha** (40-170 mL/hL)

Sredstva na osnovi morskih alg:

- **Goëmar BM 86**  **v odmerku 3,0 L/ha** (300 mL/hL)
- **ExelGrow**  **v odmerku 1,0 L/ha** (1000 mL/hL)



Protifert LMW in Drin



ExelGrow in Goëmar BM 86

Splošna priporočila

OPOMBA: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha. Porabo vode je potrebno prilagoditi posamezni kulturi, njeni vzgojni obliki in razvojni fazi ter zahtevam naprave za nanašanje.

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.