



Oljkarstvo

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zvečer se bo od severozahoda jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 °C.

Jutri bo zjutraj bo delno jasno, več zmerne oblačnosti bo lahko na severovzhodu. Ponekod po kotlinah bo kratkotrajna megla. Čez dan bo delno jasno s kopasto oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 28 °C.

Obeti V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bodo na Primorskem možne krajevne padavine. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe in nevihte možne tudi drugod. V ponedeljek kaže na sončno vreme, verjetnost za plohe je majhna.

Vremenska slika Nad državami ob Baltiku se nahaja ciklon z vremensko fronto. V pasu od zahodne, deloma srednje Evrope, prek Velike Britanije do Norveške se nahaja območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka bolj vlažen in še vedno hladen zrak.

*Vir: ARSO, petek, 11. julija 2025 ob 09:00

SVETOVANJE

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska
Primož Štepic, dipl. ing. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška
Matej Ščuka, mag. ing. agr.
031 316 296, matej.scuka@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija
Marjan Kragl, univ. dipl. ing. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Podravska in pomurska regija
Drago Majcen, univ. dipl. ing. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl.inž.agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Marketing in razvoj
Andrej Kos, univ. dipl. ing. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si

Varstvo in foliarna prehrana oljk

Oljčna muha

Oljkarjem priporočamo, da s feromonsko vabo **Dacotrap** redno spremljajo pojav **oljčne muhe**. Prag škodljivosti je 3 muhe/vabo/teden. Njen napad lahko spremljamo tudi s pregledovanjem plodov, kjer pa je prag škodljivosti 3 % napadenih plodov s t.i. fertilnimi vbodi, kar pa pomeni že prisotnost jajčec ali živih žerk in seveda tudi škodo. Povečan let je po zadnjih padavinah zaznan predvsem na Vipavskem in v Goriških brdih. Pri močnejšem ulovu lahko pridelovalci uporabijo sistemski insekticid, pri manjšem pa insekticidno vabo. **Priporočilo:**


- **Mospilan 20 SG v odmerku 300 g/ha** (30 g/hL), ki ga uporabimo pri močnejšem napadu ali
- **GF-120  v odmerku 1-1,2 L/ha** pri porabi 10 L vode na ha, oziroma pri porabi 33 mL škropilne brozge na drevo pri gostoti sajenja 300 dreves na hektar. Tretira se notranji del južne strani krošnje. Priporoča se tretiranje vseh dreves v nasadu, razen v primeru gostih nasadov, kjer se lahko tretira vsako drugo ali tretje drevo. Tretiramo, ko so oljke v razvojni fazi, ko ima plod približno 50 % končne velikosti - koščice pričnejo lignificirati - pokaže se odpornost na urez (BBCH 75). Čas tretiranja prilagodimo tudi razvojni fazi škodljivca, zato upoštevamo napovedi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Sredstvo uporabimo pred odlaganjem jajčec na plodove. Nadaljnja tretiranja opravimo v časovnih razmikih od 7 do 12 dni. Tretiranje ponovimo v primeru povečanega pojava oljčne muhe ali v primeru večjih količin padavin (5-10 mm). **Opozorilo:** s sredstvom lahko v eni rastni sezoni na istem zemljišču tretiramo največ 4-krat. Pri tretiranju je priporočena velikost kapljic 4-6 mm, kar dosežemo z nizkim pritiskom.



Oljčna muha



GF-120 in Mospilan 20 SG



Oljkova siva pegavost ali pavje oko na listju

Foliarna prehrana

V oljčnikih, kjer se je lani in letos spomladi pojavila **oljkova siva pegavost** ali **pavje oko**, lahko zaradi zadnjih padavin pride do ponovne okužbe. Za dvig odpornosti oljk se lahko dodajajo bakrova foliarna gnojila, za izboljšanje fotosinteze, ki pa vpliva na višjo kvaliteto in odstotek olja, pa magnezijeva. **Priporočilo:**

Dvig odpornosti

- **Karsia Baker  v odmerku do 3,5 L/ha** (300 mL/hL)

Dodajanje magnezija

- **Magnesiogreen  v odmerku 3,5 kg/ha** (350 g/hL) ali
- **Protifert Magnezij  v odmerku 5 L/ha** (500 mL/hL).



Karsia Baker, Magnesiogreen in Protifert Magnezij

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin.

V ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/100 L**. Sredstvo je dovoljeno tudi v ekološki pridelavi.



Nu-Film-Premium

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- **pH minus v odmerku 44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno



pH minus

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**. V takem primeru se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres.

Sredstva na osnovi aminokislin:

- **Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha** (350 mL/hL)
- **Drin** v odmerku **0,4-1,7 L/ha** (40-170 mL/hL)

Sredstva na osnovi morskih alg:

- **Goëmar BM 86**  **v odmerku 3,0 L/ha** (300 mL/hL)
- **ExelGrow**  **v odmerku 1,0 L/ha** (1000 mL/hL)



Protifert LMW in Drin



ExelGrow in Goëmar BM 86

Opomba: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha. **Porabo vode prilagodimo vzgojni obliki.**

Splošna priporočila

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.