



Poljedelstvo

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes bo povečini sončno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo v zahodnih krajih. Popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 °C.

Jutri bo sprva precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Čez dan bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju 5, najvišje dnevne od 13 do 18 °C.

Obeti V četrtek in petek bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, ki bo občasno možna tudi ob morju.

Vremenska slika Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad Alpami se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki tudi pri nas povzroča nekoliko spremenljivo vreme.

*Vir: ARSO; torek, 03. marec 2026 ob 06:00

SVETOVANJE

Podravska in pomurska regija

Drago Majcen, univ. dipl. ing. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl.inž.agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija

Marjan Kragl, univ. dipl. ing. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska

Primož Štepic, dipl. ing. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Marketing in razvoj

Andrej Kos, univ. dipl. ing. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Varstvo oljne ogrščice

Varstvo pred škodljivci

V začetku tega tedna smo na večjem številu lokacij v SV Sloveniji v posevkih oljne ogrščice zabeležili izredno povečane ulove **kljunotajev**, ki praktično povsod močno presegajo pragove škodljivosti. Zato pridelovalcem svetujemo, da nemudoma postavijo rumene lovilne posode z vodo (dodati malo detergenta za pomivanje posode) ali vsaj rumene lepljive plošče, ki morajo biti postavljene v višini habitusa posevka ter redno spremljajo število ulovljenih škodljivcev. Vabe ali plošče nastavimo v smeri kjer predvidevamo nalet škodljivca (ozelenitev s križnicami, rob gozda, živa meja, parcela kjer je lani rastla oljna ogrščica). Predlagamo, da postavite dve vabi ali plošči na parcelo, eno na robu iz smeri naleta in eno v notranjosti parcele. Vabe/plošče kontroliramo po možnosti vsak dan ali vsaj na 2 do 3 dni. Redno je potrebno pregledovati tudi rastline. Prag škodljivosti za stebelnega kapusovega kljunotaja je presežen ob ulovu 15 hroščkov/posodo/na 3 dni, za repičnega kljunotaja pa je prag škodljivosti 5 hroščkov/posodo/na 3 dni.

V zadnjih letih so **kljunotaji** na nezaščenih posevkih povzročili precejšen izpad pridelka in tako veliko gospodarsko škodo, zato moramo pojav teh škodljivcev jemati skrajno resno, ker lahko naredijo v praksi bistveno več škode, kot pa npr. kasneje repičar. Po pojavu **stebelnega kapusovega kljunotaja**, samičke odlagajo jajčeca okoli 7-10 dni, dočim samičke **velikega ogrščičnega kljunotaja** pričnejo z odlaganjem jajčec zelo hitro, kakšen dan ali dva po pojavu škodljivca. Škodo povzročajo ličinke, ki se zavrtajo v steblo s tem rastlini zmanjšajo dostop do vode in hranilnih snovi, obstoječe rane pa predstavljajo tudi vstopno mesto za bolezni (glive Phoma, Botrytis in Verticillium). Škodo opazimo večinoma prepozno oz. v času žetve ali ob žetvi. Rastline lahko že prej plegajo v otokih. **Priporočilo za zatiranje:**

- v kolikor je presežen skupen prag škodljivosti za kljunotaje, ki znaša **10-20 hroščkov/posodo/na 3 dni**, svetujemo takojšnje ukrepanje z insekticidom **Mavrik 240 EW v odmerku 0,2 L/ha** (pakiranje 0,2 L in 1 L). Insekticid **Mavrik 240 EW** zelo dobro deluje tako pri višjih kot tudi pri nizkih temperaturah, zato je odlična izbira tudi v hladnejših pomladih.
- pri uporabi piretroidnih insekticidov je nujno zakisanje vode, zato priporočamo **pH minus v odmerku 44 - 104 mL/100 L vode**, za znižanje kislosti na pH pod 6,5.
- za dobro učinkovitost je potrebna tudi dobra omočenost rastlin in čim daljši stik s škodljivcem. V ta namen dodamo močilo/lepilo **Nu-Film-Premium v odmerku 30 mL/100 L vode** še posebej zato, ker se uporabljajo kontaktna sredstva.



Veliki ogrščični kljunotaj



Vbodna mesta odlaganja jajčec, poškodbe/pokanje stebela



Mavrik 240 EW 200 mL in 1 L



pH minus in Nu-Film-Premium

Varstvo in prehrana oljne ogrščice

Varstvo pred ozkolistnimi (travnimi) pleveli

Zaradi tople jeseni lahko na določenih posevkih oljne ogrščice, kjer ni bilo uporabe jesenskega graminicida, pričakujemo močnejši pojav travnih plevelov, kot so **samonikla žita** in **srakoprec**. **Priporočilo:**

- svetujemo pregled posevkov na zastopanost travnih plevelov in pravočasno zatiranje s herbicidom **Agil 100 EC v odmerku do 1 L/ha**. Tretiranje opravimo dokler oljna ogrščica ne prekrije plevelov. Glede na temperaturo tal, ki so še hladna in plevi še niso v intenzivni aktivni rasti, bi z ukrepom zatiranja ozkolistnih plevelov bilo smiselno počakati še kakšen teden ali dva. Sredstvo lahko uporabimo v okviru KOPOP in na VVO.



Agil 100 EC

Foliarno dognojevanje z biostimulantom

V vseh primerjalnih poskusih s podobnimi sredstvi, je biostimulant **ExelGrow** dal vedno najboljše rezultate. Je biostimulant na osnovi morskih alg, pridobljenem po posebnem postopku, ki dviguje kvaliteto in hektarski pridelek. **Priporočilo:**

- **ExelGrow v odmerku 0,5 L/ha** uporabimo spomladi dva (2) krat, od pričetka vegetacije pa vse do pričetka cvetenja.



Biostimulant - ExelGrow

Foliarno dognojevanje z borom in fosforjem

Bor je hranilo, ki je pri pridelavi oljne ogrščice izrednega pomena. Spomladi se priporoča dognojevanje saj pomanjkanje tega hranila vodi k znižanju pridelka in poškodbam na rastlinah, kot je npr. pokanje stebela, listne ploskve starejših listov pa se od roba navznoter obarvajo rahlo vijolično. **Priporočilo:**

- **Karsia Bor v odmerku 2-3 L/ha** ali **Protifert Bor v odmerku 1,5-2,5 L/ha**.



Pomanjkanje bora - pokanje stebel ogrščice

Na težjih, mokrih tipih tal, ki ostajajo dlje časa hladna, je sprejem **fosforja** omejen, zato je razvoj koreninskega sistema upočasnen. Ker fosfor predstavlja vir energije za vse razvojne procese v rastlini, ga je priporočljivo dodajati. **Priporočilo:**

- **Karsia Fosfor v odmerku 3-5 L/ha**. Dodajamo ga v škropilnico kot prvega, ker nam lahko služi tudi kot sredstvo za zakisanje škropilne brozge, ki je potrebna pri uporabi insekticidov.



Karsia Bor in Protifert Bor

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin. **Priporočilo:**

- v ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/100 L vode.**

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- pH minus** v odmerku **44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**, se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres. **Priporočilo:**

Sredstva na osnovi aminokislin:

- Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha (350 mL/hL)**
- Drin** v odmerku **0,4-1,7 L/ha (40-170 mL/hL)**

Sredstva na osnovi morskih alg:

- ExelGrow** v odmerku **1,0 L/ha (1000 mL/hL)**



Nu-Film-Premium



pH minus



Protifert LMW in Drin



ExelGrow

Splošna priporočila

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.