




Sadjarstvo

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes bo v vzhodni Sloveniji sončno in suho. Na zahodu bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 °C.

Jutri bo v zahodnih krajih pretežno oblačno s krajevnimi plohami, ki se bodo popoldne širile nad osrednjo Slovenijo. Sončno in suho bo v severovzhodnih krajih. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 10 do 15, na vzhodu do 18 °C.

Obeti V četrtek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe.

V petek kaže na suho vreme. Sprva bo še precej oblačnosti, čez dan pa se bo jasnilo. Še bo razmeroma toplo.

Vremenska slika Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo je nekoliko oslabilo. S šibkim jugozahodnikom nad naše kraje doteka postopno bolj vlažen in še vedno razmeroma tople zrak.

*Vir: ARSO, torek, 10. marec 2026 ob 09:00

SVETOVANJE

Podravska in pomurska regija

Drago Majcen, univ. dipl. inž. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl. inž. agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija

Marjan Kragl, univ. dipl. inž. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska

Primož Štepic, dipl. inž. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Marketing in razvoj

Andrej Kos, univ. dipl. inž. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Varstvo pečkarjev

Bakterijske in glivične bolezni

Razvoj pečkarjev je glede na sorto in lego zelo različen. Zgodnejše sorte ponekod že prihajajo v fazo **mišjega ušesca**, ostale so v fazi odpiranja brstov. Kljub relativno visokim dnevnim temperaturam, so nočne še vedno kar nizke, kar pa ne dopušča hitrejšega razvoja, kar je seveda dobro.

Vremenska napoved za prihodnje dni kaže poslabšanje od srede oz. četrтка naprej, malo močnejša vremenska motnja pa naj bi nas prešla čez vikend ali v pričetku prihodnega tedna. Le-ta bi naj s seboj prinesla tudi nekaj padavin, mogoče tudi nekaj snega, saj se bo ohladilo.

Torej pred nami je mogoče eno daljše mokro in hladnejše obdobje in glede na fenološko stanje bo potrebno pred padavinami obvezno opraviti zaščito pred **jablanovim škrlupom**. V sadovnjakih, kjer je v prejšnjih letih prišlo do okužb z **bakterijskim hruševim ožigom**, se lahko uporabijo tudi bakreni fungicidi in biotični fungicidi na osnovi bakterij. **Priporočilo za uporabo fungicidov:**

Bakterijski hrušev ožig

- **Badge WG**  **v odmerku 2,9 kg/ha** (290 g/hL, 29 g/10 L) se uporabi 2 x od faze brstenja pa do faze pričetka cvetenja ali
- **Amylo-X**  **v odmerku 1,5-2,5 kg/ha** (150-250 g/hL, 15-25 g/10 L), ki je biotični fungicid in se lahko uporabi do 6 x v eni sezoni od faze mišjega ušesca naprej.

Jablanov škrlup

- **Syllit 400 SC** **v odmerku 1,9 L/ha** (190 mL/hL, 19 mL/10 L) lahko uporabljamo 2-krat od faze brstenja pa do faze balona. Sredstvo ima zelo dobro delovanje tudi pri nižjih temperaturah, tretiramo pa lahko tudi, če so rastlinski deli navlaženi.
- **Pyrus 400 SC** **v odmerku 1,0 L/ha** (100 mL/hL, 10 mL/10 L) lahko uporabljamo 3-krat od faze brstenja pa do konca cvetenja; sredstvo ima zelo dobro delovanje tudi pri nižjih temperaturah.
- **Delan Pro**  **v odmerku 2,5 L/ha** (250 mL/hL, 25 mL/10 L) lahko uporabljamo do 6-krat v eni sezoni in to od faze brstenja naprej. Pri uporabi sredstev na osnovi ditionona moramo upoštevati najvišjo skupno količino učinkovine, ki je 2.625 g/ha v eni sezoni.



Odpiranje brstov



Amylo-X in Badge WG



Jablanov škrlup - primarna okužba



Syllit 400 SC, Delan Pro in Pyrus 400 SC

Varstvo pečkarjev

Jablanova bolšica

Ni direktni škodljivec na jablanah, je pa prenašalec fitoplazme metličavosti jablan. Bolšica se prične pojavljati v fazi brstenja in takrat je tudi čas za njeno zatiranje. **Priporočilo za uporabo insekticida, dovoljenega za nujne primere:**

- **Mavrik 240 EW v odmerku 0,2 L/ha** (20 mL/hL) se uporablja na jablanah za zatiranje **bolšic iz rodu Cacopsylla**. Poraba vode naj bo 500-1.000 L na ha.
Opozorilo: za optimalno delovanje insekticida je potrebno vodo predhodno zakisati na vrednost pod 6,5 pH. To dosežemo z dodajanjem posebnega sredstva **pH minus v odmerku 44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje. Za dobro omočljivost se priporoča dodajanje močila/lepila **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/100 L vode**.
Opozorilo: s sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ **dvakrat** v eni rastni dobi, v razmaku 14 dni.



Bolšici iz rodu *Cacopsylla*



Insekticid Mavrik, posebno sredstvo pH minus

Zatiranje škodljivih pršic prelka

Pršice prelke so pogost pojav na pečkarjih, za znižanje populacije pa se v času brstenja uporabljajo akaricidi na osnovi parafinskega olja, ki pokrijejo pršice in le-te se zadušijo. **Priporočilo:**

- akaricid **Belo olje Karsia**  **v odmerku 10 L/vmk/ha** (**vmk = višinski meter krošnje**) ob porabi vode 500 L/ha na meter višine krošnje. Najvišji hektarski odmerek je 30 L/ha. Sredstvo se lahko uporabi 1 x v rastni sezoni, od faze brstenja pa do faze mišjega ušesca.



Zimska jajčeca pršic prelka



Belo olje Karsia

Varstvo koščičarjev

Listna luknjičavost koščičarjev

Je v mokrih letih zelo pomembna bolezen češenj, višenj, marelic, breskev in nektarin, pojavljajo pa se še druge glivične in bakterijske bolezni, zato je zaščita v času brstenja izredno pomembna. Ker bi naj po obdobju padavin nočne oz. jutranje temperature ponekod padle tudi pod ledišče, je bakrene fungicide potrebno uporabiti čim prej. **Priporočilo za zmanjšanje okužb z listno luknjičavostjo in gnilobami:**

- **Badge WG**  v odmerku **3,5 kg/ha** (350 g/hL, 35 g/10 L vode). Uporabljamo ga lahko dokler niso vidni zeleni listni vršički, rjave luske pa so odpadle in so brsti obdani s svetlozelenimi luskami.



Listna luknjičavost koščičarjev

Breskova kodravost

Je najnevarnejša glivična bolezen breskev in nektarin, ki jih najpogosteje okuži prav v takšnih vremenskih razmerah, ki se bodo odvijale prihajajoči vikend – mokro in hladno. Ker bolezen obvladujemo le preventivno, je potrebno opraviti zaščito vedno pred padavinami. **Priporočilo:**

- **Syllit 400 SC** v odmerku **2,25 L/ha** (225 mL/hL, 22 mL/10 L vode), ki ga uporabimo vedno pred dežjem, saj kurativnega delovanja nima noben fungicid. Uporabljamo ga lahko 2 x v rastni sezoni od faze konca nabrekanja brsta pa do konca cvetenja. **Syllit 400 SC je edini fungicid na osnovi dodina, ki je dovoljen v tem času.**



Breskova kodravost

Češpljeva metličavost

Zatiramo jo podobno kot breskovo kodravost – preventivno v fazi brstenja pa do faze, ko so vidni posamezni cvetni popki (še vedno zaprti), na kratkih pecljih, zelene luske rahlo odprte. **Priporočilo:**

- **Badge WG**  v odmerku **3,5 kg/ha** (350 g/hL, 35 g/10 L vode) v času dokler niso vidni zeleni listni vršički.



Cvetna monilija

Cvetna monilija

V južnih predelih marelice, breskve in nektarine že cvetijo, zato jih je pred to glivično boleznijo potrebno zaščititi še pred dežjem. **Priporočilo:**

- **Amylo-X**  v odmerku **1,5-2,5 kg/ha** (150-250 g/hL, 15-25 g/10 L), lahko uporabimo tudi v poln cvet. Sredstvo v vodo za škropljenje dodajamo zelo počasi ob konstantnem mešanju, da ne bi prišlo do pojava grudic.



Fungicidi Badge WG, Syllit 400 SC in Amylo-X


Foliarna prehrana koščičarjev

Stresne situacije, boljša oplodnja

Foliarna gnojila dodajamo za preprečevanje stresnih situacij, predvsem zmrzali in ciljno za boljšo oplodnjo in višji ter kvalitetnejši pridelek.

Priporočilo:

- **Protifert LMW**  v odmerku **3,5 L/ha** (350 mL/hL, 35 mL/10 L) ali
- **Drin** v odmerku **1,5 L/ha** (150 mL/hL, 15 mL/10 L) za dvig odpornosti proti nizkim temperaturam;
- obe gnojili ne smemo mešati s pripravki na osnovi bakra.
- **ExelGrow** v odmerku **1,0 L/ha** (100 mL/hL, 10 mL/10 L) za preprečevanje stresa, boljšo oplodnjo in višji pridelek;



Cvetz marelice



Protifert LMW, Drin in ExelGrow

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin. **Priporočilo:**

- v ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/ 100 L vode.**

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- **pH minus** v odmerku **44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**, se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres. **Priporočilo:**

Sredstva na osnovi aminokislin:

- **Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha** (350 mL/hL)
- **Drin** v odmerku **0,4-1,7 L/ha** (40-170 mL/hL)

Sredstva na osnovi morskih alg:

- **ExelGrow** v odmerku **0,5-1,0 L/ha** (50-100 mL/hL)



Nu-Film-Premium



pH minus



Protifert LMW in Drin



ExelGrow

Splošna priporočila

OPOMBA: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha. Porabo vode je potrebno prilagoditi posamezni kulturi, njeni vzgojni obliki in razvojni fazi ter zahtevam naprave za nanašanje.

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.