



Poljedelstvo

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 °C.

Ponoči bodo padavine povsod ponehale, delno se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v alpskih dolinah malo pod 0 °C.

Jutri bo delno jasno in povečini suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 °C.

Obeti V soboto in nedeljo bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe, več jih bo v soboto, ko bo pihal tudi jugozahodni veter.

Vremenska slika Nad južnim delom Evrope prevladuje območje visokega zračnega tlaka, nad Ligurskim in Tirenskim morjem pa je plitev ciklon. Oslabljen vremenska motnja se zadržuje nad srednjo Evropo in Alpami in bo danes oslABLJENA nekoliko vplivala tudi na vreme v Sloveniji.

*Vir: ARSO; četrtek, 12. marec 2026 ob 06:00

SVETOVANJE

Podravska in pomurska regija

Drago Majcen, univ. dipl. ing. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl.inž.agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija

Marjan Kragl, univ. dipl. ing. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska

Primož Štepic, dipl. ing. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Marketing in razvoj

Andrej Kos, univ. dipl. ing. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Varstvo ozimnih žit

Varstvo pred plevli

Zima se je dokončno poslovila in dvig temperatur je v zadnjih dneh pospešil vegetacijo žit. Opažamo, da je zastopanost in razvitost plevelov odvisna od načina obdelave in tipa tal. Svetujemo pregled posevkov in v kolikor so plevli že dovolj razviti, se naj opravi ukrep herbicidiranja. Najboljše je, da se škropljenje izvede preden začnejo žita močneje prekrivati tla, da se doseže dobra pokrovnost plevelov s herbicidom. Na težjih in hladnejših tleh, kjer plevli še niso dovolj razviti, lahko s škropljenjem še počakamo, kajti če je zastopanost plevelov še preslaba, bo sledil kasnejši vznik plevelov, ki bi jih z zgodnjim škropljenjem zgrešili. V prvi polovici marca še posebej pazimo na dnevne temperature, ki naj bodo v času ukrepa nad 5 °C, nočne pa ne smejo pasti pod ledišče. Plevle je najbolj optimalno zatirati v razvojni fazi 2-4 listov, ko so v aktivni rasti, kajti takrat je delovanje herbicidov najboljše. Prednost pri zatiranju plevelov dajemo ječmenu in zgodaj sejanim posevkom pšenice.

Za celovito zatiranje plevelov v pšenici priporočamo v praksi preverjeno kombinacijo herbicidov **Pallas 75 WG** in **Mustang 306 SE** ali kombinacijo **Pallas 75 WG** in **Mustang Forte**, ki jo lahko uporabimo še v rži in tritikali.

Pallas 75 WG je zanesljiv in preverjen herbicid za spomladansko zatiranje plevelov v pšenici, rži in tritikali. Je tudi uveljavljen standard za zatiranje **navadnega srakoperca** (*Apera spica-venti*), ki od travnih plevelov prevladuje na naših njivah. Odlično zatira tudi ostale enoletne ozkolistne plevle in večino pomembnejših enoletnih širokolistnih plevelov. **Pallas 75 WG** se lahko uporablja samostojno od faze dveh razgrnjenih listov, pa do pojava drugega kolenca, pri optimalni temperaturi od 5-25 °C in pri priporočeni porabi vode 200 L/ha. V pšenici se priporoča kombinacija s herbicidom **Mustang 306 SE** ali **Mustang Forte**. **Priporočilo:**

- **Pallas 75 WG** v odmerku 250 g/ha uporabimo ob zastopnosti travnih plevelov, kot so ljuljka, navadni lisičji rep, stoklase in oves, samostojno s priloženim močilom Nu-Film-Premium v odmerku 30 mL/100 L, kar pomeni 60 mL pri porabi vode 200 L/ha.

Pallas 75 WG v odmerku 200 g/ha + **Mustang 306 SE** v odmerku 0,6 L/ha uporabimo v posevkih pšenice, kjer je od ozkolistnih plevelov prisoten samo srakoperec ali pahovka. Gre za odlično kombinacijo, ki učinkovito zatira tudi močno razvito plezajočo lakoto ali smolenec, modri glavinec, mak ter ostale enoletne širokolistne plevle. **Priporočilo:**

- **Pallas 75 WG** v odmerku 200 g/ha + **Mustang Forte** v odmerku 1 L/ha uporabimo v posevkih, kjer je prisoten osat, večje kamilice in močneje razvit modri glavinec. To je najmočnejša herbicidna kombinacija na trgu na osnovi štirih učinkovin in zanesljiva za najtežje zapleveljene posevke pšenice, rži in tritikale.



Močno zapleveljen posevek pšenice



Navadni srakoperec ali pahovka



Pallas 75 WG



Mustang 306 SE in Mustang Forte

Varstvo ozimnih žit

Dve novosti pri varstvu pred pleveli

V letošnjem letu je na razpolago odličen novi herbicid **Tarzec**, ki je specialist za zatiranje navadnega srakoperca in mrtve koprive. Je na osnovi dveh učinkovin piroksulama in haloaksifen metila, uporablja pa se lahko po vzniku v pšenici, rži, tritikali in piri. **Tarzec** poleg navadnega srakoperca odlično zatira ostale ozkolistne plevela, kot sta lisičji rep in ljuljke ter seveda pomembne enoletne širokolistne plevela, kot so plezajoča lakota, kamilica, jetičniki in drugi. Tarzec pa je še posebej odlična izbira za posevke, ki so zapleveljeni s škrlatno rdečo mrtvo koprivo, za zatiranje katere do sedaj nismo imeli najboljših izbire.

Priporočilo:

- **Tarzec v odmerku 75 g/ha** vse do razvoja 2. kolenca; zaradi izboljšanja delovanja svetujemo dodajanje močila **Nu-Film-Premium v odmerku 30 mL/100 L**, kar pomeni 60 mL pri porabi vode 200 L/ha.

Nova moč za zatiranje plevelov v ječmenu in pšenici je herbicid **Time-line FX**, ki je poseben specialist za zatiranje najtežje zapleveljenih njiv saj vsebuje kar tri odlične in superiorne učinkovine kot so pinoksaden, florasulam in fluroksipir meptil. Je zanesljiva izbira za zatiranje **srakoperca, ljuljk** in ostalih ozkolistnih plevelov z odličnim delovanjem tudi na najbolj problematične enoletne širokolistne plevela kot je **plezajoča lakota, kamilice, poljski mak, modri glavinec** in drugi. **Priporočilo:**

- **Timeline FX v odmerku 1,5 L/ha**, priporočamo še posebej v ječmenu, ki je zaradi zgodnejšega razvoja praviloma bolj in močneje zapleveljen, zato je potreben zanesljiv herbicid. V primeru zapleveljenosti z **njivskim lisičjim repom** (redkeje samo v Pomurju) se priporoča odmerek 2,0 L/ha. Lahko ga uporabimo tudi v pšenici v istem odmerku 1,5 L/ha. Zaradi izboljšanja delovanja svetujemo dodajanje močila Nu-Film-Premium v odmerku 30 mL/100 L. **Timeline FX** je izredno selektiven v pšenici in ječmenu saj je njegova uporaba možna vse do BBCH 37, ko je viden zgornji list zastavičar, vendar je še zviti. Tako pozna uporaba sicer ni skladna z dobro agronomsko prakso, a priča o odlični selektivnosti in možnosti za zelo pozne korekcije!

Zatiranje širokolistnih plevelov v žitih

Za zatiranje samo **širokolistnih plevelov** v pšenici, kot so npr. **smolenec, kamilica, plešec**, pa tudi **manjši njivski osat**, svetujemo uporaba herbicida **Mustang 306 SE v odmerku 0,6 L/ha**. Uporabljamo ga lahko od začetka razraščanja pa vse do pojava 2. kolenca. V kolikor gre v posevku **za večjo zastopanost z njivskim osatom**, pa v pšenici, rži in tritikali, pa tudi v jarinah in ovsu, priporočamo uporabo herbicida **Mustang Forte v odmerku 1 L/ha** (0,8 L/ha jarine).



Škrlatno rdeča mrtva kopriva



Novi herbicid Tarzec (pakiranje 75 g)



Zapleveljen ječmen z modrim glavincem



Novi herbicid Timeline FX (pakiranje 1 L)

Varstvo in prehrana ozimnih žit

Preprečevanje poleganja žit

Za intenzivno pridelavo žit in za doseganje visokega ter kakovostnega pridelka, je nujna uporaba rastlin regulatorjev, da z njimi zmanjšamo možnost poleganja žit, ki so vedno bolj na udaru zaradi intenzivnih neviht. Uporaba rastnih regulatorjev se še posebej priporoča na zgodaj posejanih in gostih posevkih ter visokih sortah žit. **Priporočilo:**

- **Stabilan 750 SL v odmerku 2 L/ha** v razvojni fazi ob koncu razraščanja pa do pojava 1. kolenca 1 cm nad tlemi. Njegovo delovanje izrazito zniža bazalni (spodnji) del stebela žit, ki so zaradi tega bistveno bolj stabilna oz. odporna na poleganje. Pomembno je, da so v času tretiranja rastline dobro ukoreninjene, niso v stresu, dnevna temperatura naj bi bila od 8-10 °C, nočna pa ne sme pasti pod 0°C. Vsaj 2 uri po tretiranju ne sme biti padavin. **Stabilan 750 SL** je dobro kompatibilen z večino sredstev za varstvo rastlin in gnojili (npr. **Karsia Mangan**).

Prehrana žit z manganom spomladi

Mangan je hranilo, ki ga žita nujno potrebujejo. Najbolj je na pomanjkanje mangana občutljiv ječmen. Mangan je osnovni gradnik klorofila, tako da če ga ni dovolj je fotosinteza slabša, kar pomeni manjši pridelek. Mangan je tudi pomemben za dvig odpornosti žit proti boleznim in za razvoj kvalitetnega zrnja. Spomladi je še možnost dognojevanja z manganom in to še posebej na oslabljenih posevkih ječmena. **Priporočilo:**

- **Karsia Mangan v odmerku 2 L/ha** (lahko ga kombiniramo skupaj s herbicidi in regulatorji rasti).



Stabilen posevek pšenice



Regulator rasti Stabilan 750 SL



Pomanjkanje mangana



Karsia Mangan

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin. **Priporočilo:**

- v ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/100 L vode.**



Nu-Film-Premium

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- pH minus** v odmerku **44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno



pH minus

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**, se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres. **Priporočilo:**

Sredstva na osnovi aminokislin:

- Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha** (350 mL/hL)
- Drin** v odmerku **0,4-1,7 L/ha** (40-170 mL/hL)

Sredstva na osnovi morskih alg:

- ExelGrow** v odmerku **0,5-1,0 L/ha** (50-100 mL/hL)



Protifert LMW in Drin



ExelGrow

Splošna priporočila

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.