



Lupinarji - oreh

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes Danes zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nato deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 °C.

Jutri bo večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 °C.

Opozorilo V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi do osrednjih krajev. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.

Vremenska slika Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila nad vzhodni in osrednji Balkan. Od severozahoda doteka v višinah k nam nekoliko hladnejši in občasno še razmeroma vlažen zrak..

*Vir: ARSO, torek, 18. avgust 2026 ob 06:00

SVETOVANJE

Podravska in pomurska regija

Drago Majcen, univ. dipl. inž. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl. inž. agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija

Marjan Kragl, univ. dipl. inž. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si
Brina Stajniko, dipl. inž. agr (UN)
031 316 296, brina.stajniko@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska

Primož Štepic, dipl. inž. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Marketing in razvoj

Andrej Kos, univ. dipl. inž. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si



KARSIA®

Varstvo lupinarjev

Orehova muha

Ohladitev in nekaj padavin je vzpodbudilo drugi rod orehove muhe k močnejšemu pojavu. Muhe se lepo lovijo na rumene lepljive plošče, prav tako pa jih lahko vidimo kako se sprehajajo in pariyo na plodovih.

Priporočilo:

- **Laser Plus**  (karenca 30 dni) v odmerku **0,075 L/ha** (7,5 mL/hL) pri porabi 3 L škroplilne brozge/drevo v polni rodnosti, pri porabi okoli 380 L vode/ha. Ker poškropimo le eno tretjino severne ali vzhodne strani krošnje, je potrebno obvezno dodati prehransko vabo **Nutrel v 1,5 % koncentraciji, to je v odmerku 1,5 L/100 L**. Sredstvo je nevarno za čebele, zato je pri škropljenju potrebno upoštevati vsa pravila dobre kmetijske prakse in v nasadu imeti pokošeno ali na kakšen drugi način odstranjeno cvetočo podrast in preprečiti zanašanje škroplilne brozge na sosednje kulture.
- **Mospilan 20 SG** (dovoljenje za nujen primere; dovoljena uporaba do 28.09.2026; uporaba največ enkrat v eni rastni dobi; karenca 14 dni) v odmerku **375 g/ha** (37,5 g/hL) ob dodatku prehranske vabe **Nutrel v 1,5 % koncentraciji, to je v odmerku 1,5 L/100 L** ali
- Oba insekticida imata stransko delovanje tudi na **jabolčnega zavijača**, ki je prav tako škodljivec na oreh.



Orehova muha



Mospilan 20 SG



Laser Plus



Beljakovinska vaba Nutrel

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin. **Priporočilo:**

- v ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/100 L vode.**

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- pH minus** v odmerku **44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**, se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres. **Priporočilo:**

Sredstva na osnovi aminokislin:

- Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha (350 mL/hL)**
- Drin** v odmerku **0,4-1,7 L/ha (40-170 mL/hL)**

Sredstva na osnovi morskih alg:

- ExelGrow** v odmerku **0,5-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)**



Nu-Film-Premium



pH minus



Protifert LMW in Drin



ExelGrow

Splošna priporočila

OPOMBA: odmerki za 10 ali 100 L (hL) vode so prilagojeni na porabo vode 1.000 L/ha. Porabo vode je potrebno prilagoditi posamezni kulturi, njeni vzgojni obliki in razvojni fazi ter zahtevam naprave za nanašanje.

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.