



Poljedelstvo

Vremenska napoved za Slovenijo*

Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 °C.

Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 °C.

Obeti V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno.

Vremenska slika Nad Biskajskim zalivom se zadržuje ciklonsko območje. Hladna fronta med Francijo in Španijo se pomika proti vzhodu. Naši kraji so v območju visokega zračnega tlaka, od zahoda doteka suh in vse toplejši zrak.

*Vir: ARSO; četrtek, 27. avgust 2026 ob 07:00

SVETOVANJE

Podravska in pomurska regija

Drago Majcen, univ. dipl. inž. agr.
031 394 227, drago.majcen@karsia.si
Kristjan Auguštin, dipl. inž. agr. (VS)
041 715 641, kristjan.augustin@karsia.si

Posavska, zasavska, savinjska, koroška in JV regija

Marjan Kragl, univ. dipl. inž. agr.
041 207 523, marjan.kragl@karsia.si
Brina Stajnko, dipl. inž. agr (UN)
031 316 296, brina.stajnko@karsia.si

Obalno-kraška, primorsko-notranjska, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska in zasavska

Primož Štepic, dipl. inž. agr.
051 319 517, primoz.stepic@karsia.si

Marketing in razvoj

Andrej Kos, univ. dipl. inž. agr.
041 689 120, marketing@karsia.si

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si

Varstvo oljne ogrščice

Varstvo pred plevami pred vznikom

Po dolgem času smo prejeli nekaj padavin (v severovzhodni Sloveniji okoli 20 mm), nekaj pa se nam jih obeta še v naslednjih dneh. Zato se nekateri kmetje že odločajo za setev oljne ogrščice, drugi pa bodo setev opravili nekoliko kasneje, v prvih dneh septembra oziroma glede na vremenske pogoje najpozneje do 15. septembra.

V Sloveniji, še posebej pa v SV delu države, so njive kar precej zapleveljene z **navadnim srakopercem** in deloma s **smolencem** oz. **plezajočo lakoto**. Zato vsi večji pridelovalci, ki so večinoma vključeni tudi v ukrepe VVO in KOPOP, za zatiranje plevelov uporabljajo v praksi preverjene kombinacije herbicidov (**Centium 36 CS** in **Belkar**), ki zagotavljajo odlično varstvo pred večino pomembnejših plevelov v oljni ogrščici. **Priporočilo:**

Zatiranje širokolistnih plevelov po setvi in pred vznikom na VVO:

- **Centium 36 CS** v odmerku **0,25 L/ha**, ki ga uporabimo takoj po setvi oljne ogrščice oz. najpozneje 3 dni po njej. Sredstvo nanesite na vlažna tla ali pred napovedanimi padavinami. Herbicid s svojim talnim delovanjem odlično zatira **plezajočo lakoto**, številne **širokolistne plevela** (prava kamilica, škrlatno rdeča mrtva kopriva, jetičnik, navadni plešec, navadna rosnica, njivska vijolica, itd.) ter nekatere **ozkolistne plevela**, med drugim **enoletno latovko**, **navadno kostrebo** in še nekatere **ozkolistne plevela**, med drugim tudi **navadni srakoprec**.

Centium 36 CS je originalni herbicid z odlično formulacijo v obliki **kapsulirane suspenzije**, ki se odlično veže na tla, zagotavlja postopno sproščanje učinkovine in s tem dolgo-ročno delovanje ter dobro obstojnost tudi v slabših, bolj sušnih razmerah, ob obilnih padavinah pa omenjena formulacija preprečuje spiranje. S tem herbicid ohranja dolgotrajno učinkovitost in ne obremenjuje okolja. Na plevela dela najboljše pred vznikom. Lahko ga uporabljamo v VVO v okviru KOPOP-a.



Navadni srakoprec



Plezajoča lakota



Centium 36 CS

Varstvo oljne ogrščice

Varstvo pred pleveli po vzniku

Priporočilo za zatiranje širokolistnih plevelov po vzniku na VVO:

Split (deljena aplikacija)

- **Belkar** v deljeni aplikaciji v odmerku **2 x 0,25 L/ha** v razmiku 10-14 dni. Glede na vremensko razmere in padavine, vlažnost in strukturo tal je potrebno po vzniku posevke dobro pregledati in uporabo herbicida prilagoditi razvoju posevka in plevelov. Na neizenačenih posevkih, herbicid **Belkar** uporabimo prvič ko je najmanjša oljna ogrščica v razvoju vsaj 2 pravih listov, čeprav so lahko na drugih delih njive že bistveno večje rastline.

Enkratni odmerek

- **Belkar** v enkratnem odmerku **0,5 L/ha** uporabimo, ko ves posevek doseže 5-6 listov in še ne prekriva tal, tako da lahko s herbicidom dobro zadene razvijajoče se pleveli. Izkušnje kažejo, da je v toplem vremenu delovanje herbicida še izrazitejše in hitrejše.

Ukrep zatiranje plevelov lahko združimo z ukrepom zatiranja škodljivcev (Mavrik 240 EW) ali ukrepom zatiranja ozkolistnih plevelov (npr. srakoperec) in samosevnih žit (Agil 100 EC).

Opozorilo: ne priporoča se mešanje s fungicidi na osnovi tebukonazola in metkonazola ter foliarnimi gnojili na osnovi bora. Časovni razmik med uporabo teh sredstev in herbicida naj bo najmanj 10-14 dni.



Oljna ogrščica - 2 prava lista



Plezajoča lakota v oljni ogrščici

Herbicidne rešitve izven ukrepov KOPOP in VVO:

- **Fuego** v odmerku **1,5 L/ha**, ki ga lahko uporabijo pridelovalci, ki niso v ukrepu KOPOP_VOD ali imajo njive izven VVO. Herbicid **Fuego** zatira širok spekter **enoletnih širokolistnih plevelov**, uporabi se pa lahko takoj po setvi in pred vznikom, pa do razvojne faze dveh pravih listov, ko pleveli praviloma še niso vznikli ali so v fazi kličnih listov. Če se pričakuje močna zapleveljenost s **smolencem** ali **plezajočo lakoto**, lahko herbicid **Fuego** kombiniramo s herbicidom **Centium 36 CS** v odmerku **0,25 L/ha**.

Korekcija travnih plevelov in samoniklih žit

- **Agil 100 EC** v odmerku **0,75-1,0 L/ha** ob dodatku močila **Nu-Film-Premium** v odmerku **30 mL/100 L vode**. S tem ukrepom ne hitimo, temveč počakamo na popolni vznik ozkolistnih plevelov, ukrep pa lahko izvedemo sočasno z drugo aplikacijo herbicida Belkar ali pri uporabi jesenskega fungicida (Orius 25 EW).



Belkar



Fuego in Agil 100 EC

Varstvo pred škodljivci

Varstvo pred polži, bolhači in repno grizlico

V času vznika in ob prisotnosti vlage oz. dežja je potrebno posevke redno pregledovati na pojav **polžev**, saj je oljna ogrščica v tej razvojni fazi najbolj občutljiva in izpostavljena. Priporočamo pravočasno ukrepanje, tako da zarobimo parcele (še posebej, če je na robu parcele jarek ali visoka trava).

Prav tako je potrebno biti pozoren na pojav **repne grizlice** in **bolhačev**, ki lahko v zelo kratkem času naredijo veliko škode. Pojav obeh škodljivcev je lahko letos zaradi toplega vremena močnejši kot običajno. Med prvimi škodljivci se pojavijo **bolhači**, zato je potrebno v času vznika posevke redno pregledovati. Prav tako je na že razvitih posevkih potrebno spremljati pojav **repne grizlice**. **Priporočilo:**

Polži

- **Polžomor Gusto 3** v odmerku **6 kg/ha**. **Polžomor** je limacid, ki ga odlikuje posebna formulacija - tehnologija Desidro, ki zagotavlja odlično obstojnost v vlažnih razmerah. Vsebuje tudi atraktant, ki **polže** močno privlači. Pakiranje 1 kg in 20 kg.

Bolhači in repna grizlica

- **Mavrik 240 EW** v odmerku **0,2 L/ha**, ki sočasno zatira **bolhače** in **repno grizlico**. Za optimalno delovanje insekticida svetujemo dodajanje posebnega sredstva za uravnavanje pH-vrednosti vode **pH minus** v odmerku **85-120 mL/100 L vode**.



Bolhač



Repna grizlica



Polžomor Gusto 3



Mavrik 240 EW in pH minus

Splošna priporočila

Izboljšanje oprijemljivosti in preprečevanje spiranja škropilne brozge

Z dodajanjem močil **zmanjšamo površinsko napetost kapljic in s tem povečamo pokrovnost in oprijemljivost škropilne brozge**, še posebej na rastlinah, ki imajo na listih voščen popr in dlačice. Sredstva na osnovi terpenov - smol, dodatno naredijo poseben film, ki **preprečuje odtekanje in spiranje škropilne brozge** zaradi padavin. **Priporočilo:**

- v ta namen priporočamo, da vsaki škropilni brozgi vedno dodate močilo/lepilo **Nu-Film-Premium**  **v odmerku 30 mL/ 100 L vode.**



Nu-Film-Premium

Optimiziranje kislosti škropilne brozge

S tem ukrepom dosežemo optimalno delovanje insekticidov, predvsem tistih iz skupine piretroidov in spinosinov ter na osnovi *Bacillus Thuringiensis*. Prav tako se podaljša razpolovna doba nekaterih fungicidov ter v večini primerov prepreči neskladje ali inkompatibilnost med posameznimi sredstvi. Optimalno kislost dosežemo s posebnim sredstvom:

- pH minus v odmerku 44-104 mL/100 L vode**, ki zniža kislost vode za škropljenje na pH <6,5, kar je optimalno



pH minus

Ukrepi v primeru stresa

V primeru **stresa**, ki so lahko posledica neugodnih vremenskih razmer, kot so **mróz, zmrzal, toča, poplava, suša, vročinski udar, slanost, prevelika ali premajhna jakost svetlobe, UV sevanje, veter, pomanjkanje hranil in fitotoksičnost, zaradi nepravilne uporabe sredstev za varstvo rastlin**, se poslužujemo uporabe sredstev na osnovi aminokislin in alg, ki umilijo ta stres. **Priporočilo:**

Sredstva na osnovi aminokislin:

- Protifert LMW**  **v odmerku 3,5 L/ha (350 mL/hL)**
- Drin** **v odmerku 0,4-1,7 L/ha (40-170 mL/hL)**

Sredstva na osnovi morskih alg:

- ExelGrow** **v odmerku 0,5-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)**



Protifert LMW in Drin



ExelGrow

Splošna priporočila

OPOZORILO: Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno prebrati etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje! Če se uporabljajo sredstva, ki so nevarna za čebele, se z njimi lahko škropi v času, ko so čebele v panjih, cvetoča podrast v nasadih pa mora biti pokošena ali na kakšen drug način odstranjena, pri škropljenju pa je potrebno zagotoviti, da ne pride do zanašanja na sosednje cvetoče kulture. Prav tako je potrebno upoštevati predpisane razdalje od voda 1. In 2. reda.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno prebrati navodilo za uporabo!

Vsem uporabnikom svetujemo nakup sredstev preverjenega izvora, kajti le tako je zagotovljena izvorna kakovost, rok trajanja in učinkovitost.